

саб® симплекс



при повышенном газообразовании

С самых первых дней



Саб® Симплекс – препарат, проверенный временем¹



Характеристики препарата²



Торговая марка

Саб®Симплекс

Активное вещество

Симетикон

Лекарственная форма

Суспензия 30 мл для приёма внутрь

Показания

- 1 Повышенное газообразование в послеоперационный период
- 2 Подготовка к диагностике желудочно-кишечного тракта
- 3 Острые отравления моющими средствами



Применение

ДА

- ✓ Во время беременности
- ✓ Во время лактации
- ✓ При сахарном диабете

Применение у новорожденных

ДА

- ✓ С первого дня жизни*

*Не рекомендуется применять у недоношенных детей

При младенческих коликах

Саб® Симплекс и кишечные колики младенцев^{2,3,5}

Причины возникновения колик

Предрасполагающие факторы:

Анатомо-физиологические особенности ЖКТ младенцев

Адаптация к внеутробному питанию, незрелость микробиома, ферментативных систем, нервной регуляции перистальтики

Группы причин:

Нарушение микробиоценоза кишечника

Пищевая непереносимость

Функциональная незрелость нервно-мышечного аппарата ЖКТ

Ферментативная недостаточность

Нерациональное вскармливание, гормональный дисбаланс.

Симптомы колик:

- ✓ возраст менее 4–5 месяцев;
- ✓ Жалобы (плач, беспокойство, вздутие живота и др.) соответствуют критериям младенческих колик (критерии Wessell);
- ✓ Реккурентный характер симптомов;
- ✓ Отсутствие признаков поражения ЦНС или нарушения развития.
- ✓ Дебют чаще всего в возрасте 3–4 недель;
- ✓ Как правило, ежедневно в одно и то же время, обычно вечернее; начинаются неожиданно на фоне полного благополучия, чаще во время или сразу после кормления;
- ✓ Длительность кишечных колик от 10 мин до 3 ч;
- ✓ После дефекации или отхождения газов отмечается улучшение;
- ✓ Беспокойство, гиперемия лица, крик, метеоризм, характерно сучение ножками;

Механизм действия симетикона (препарат Саб® Симплекс):

- 1 Изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, вызывая их разрушение.
- 2 Высвобождающиеся газы всасываются стенкой кишечника или удаляются при перистальтике кишечника
- 3 Симетикон физически и химически инертен, выводится из организма в неизменном виде



Чем хорош Саб® Симплекс?^{2,4}

Удобство приема



Для детей:

- ✓ Имеет приятный малиново-ванильный вкус
- ✓ Удобно принимать: объем разовой дозы для новорожденных – 10 капель. Разовая доза для младенцев с первого месяца жизни – 15 капель



Для мам:

- ✓ Легко дозируется встроенной капельницей – просто отсчитать 15 капель
- ✓ Экономная терапия: во флаконе 50 доз (750 капель)
- ✓ При приеме 2 раза в день флакона хватит на 25 дней
- ✓ При приеме 5 раз в день флакона хватит на 10 дней



Чем хорош Саб® Симплекс?²

Безопасность

- ✓ Не всасывается при приеме внутрь
- ✓ Не вступает в химические реакции
- ✓ Выводится из организма в неизменном виде через ЖКТ
- ✓ Не содержит углеводов, может приниматься при сахарном диабете
- ✓ Практически отсутствуют побочные эффекты
- ✓ Может приниматься длительно без вреда для организма




саб® симплекс



Результаты сравнительного исследования⁵


Центр коррекции развития детей раннего возраста
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии*

Снижение метеоризма




Метеоризм уменьшился у 100% детей, принимавших Саб® Симплекс, против 60% в сравнительной группе, принимавшей Плантекс, укропную воду, Смекту.

Снижение срыгивания



Срыгивание уменьшилось у 96% детей, принимавших Саб® Симплекс, против 65% в контрольной группе, принимавшей Плантекс, укропную воду, Смекту.

Купирование кишечных колик



Кишечные колики были купированы у 92% детей, принимавших Саб® Симплекс, против 66% в контрольной группе, принимавшей Плантекс, укропную воду, Смекту.

*В исследовании принимало участие 40 детей: 25 в основной группе, 15 – в контрольной

При **повышенном** газообразовании и метеоризме²

Саб® Симплекс – при повышенном газообразовании у детей в любом возрасте²

Метеоризм может возникать у детей:

- 1 При введении прикорма
- 2 При употреблении в пищу новых/непривычных продуктов
- 3 При употреблении продуктов, вызывающих повышенное газообразование



Саб® Симплекс – при повышенном газообразовании у детей в любом возрасте²

Необходимая дозировка, согласно инструкции:

Дети от года до 6 лет:

15 капель (0,6 мл) во время или после еды.
При необходимости, дополнительно 15 капель на ночь

Дети от 6 до 15 лет:

20-30 капель (0,8-1,2 мл)

Преимущества:

- ✓ Не влияет на процессы пищеварения
- ✓ Полностью выводится из организма
- ✓ Может использоваться многократно в течение дня длительное время для купирования симптомов

В педиатрической практике предпочтение отдается назначению жидких форм симетикона⁶



Саб® Симплекс – при повышенном газообразовании у взрослых²

Дозировка для взрослых:

- 1 30-45 капель (1,2-1,8 мл)
- 2 Эту дозу следует принимать каждые 4-6 ч.;
при необходимости она может быть увеличена
- 3 Саб® Симплекс лучше всего принимать во время
или после еды и, при необходимости, перед сном



Преимущество суспензии как лекарственной формы^{7,8}

Препараты в форме **суспензии** быстрее и полнее проявляют лечебное действие, чем твердые лекарственные формы, такие как порошки.

Это достигается за счет более высокой степени дисперсности действующего вещества



При подготовке к диагностическим исследованиям ЖКТ²

Подготовка к диагностике ЖКТ²



Рентгенологическое исследование

Для подготовки к рентгенографии за день до исследования вечером следует принять 3-6 чайных ложек Саб® Симплекс.



Ультразвуковое исследование

При подготовке к УЗИ рекомендуется принять 3 чайных ложки Саб® Симплекс вечером за день до исследования и 3 чайных ложки за 3 ч. до исследования.



Эндоскопия

Перед эндоскопией следует принять ½ - 1 чайную ложку Саб® Симплекс. Во время исследования через эндоскоп можно ввести дополнительно несколько миллилитров суспензии Саб® Симплекс.



При подготовке к диагностическим исследованиям желудочно-кишечного тракта использовать легче, если с флакона удалить пипетку.

Саб® Симплекс – показания и способ применения²

От вздутия и колик поможет вам кролик

Рекомендация качественного и экономичного препарата-пеногасителя позволит обеспечить приверженность пациентов назначенному курсу подготовки к исследованию и получить **высокоточный и достоверный его результат⁷**



**При острых
отравлениях
моющими
средствами²**

При отравлениях моющими средствами²

При острых отравлениях моющими средствами, содержащими поверхностно-активные вещества, при их попадании в желудок

Доза зависит от тяжести отравления.

Рекомендуемая минимальная доза Саб® Симплекс составляет 1 чайную ложку



саб® симплекс



**Саб® Симплекс! –
забота с первых дней
жизни о малыше
и его родителях!**



Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Саб® Симплекс

МНН: симетикон.

Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Фармакотерапевтическая группа:

Полисилоксаны, пеногасители: препараты применяемые при функциональных кишечных и желудочно-кишечных расстройствах.

Показания к применению:

Для симптоматической терапии нарушений со стороны ЖКТ, связанных с повышенным газообразованием, например, метеоризм, вздутие живота; при подготовке к диагностическим обследованиям в области живота, например, рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование (УЗИ) и подготовке к гастроудоденоскопии; при повышенном газообразовании в послеоперационный период; при отравлении моющими средствами.

Противопоказания:

Гиперчувствительность к симетикону или к любому из вспомогательных веществ.

Беременность и кормление грудью:

Применение препарата во время беременности и кормления грудью не связано с каким-либо риском.

Способ применения и дозы: Внутрь.

При жалобах, связанных с младенческими коликами и с избыточным газообразованием.

Новорожденные:

- Разовая доза – 10 капель (0.4 мл)
- Максимальная суточная доза – 4 x 10 капель (1.6 мл)

Младенцы (> 4 недели до ≤ 12 месяцев):

- Разовая доза – 15 капель (0.6 мл)
- Максимальная суточная доза – 6 x 15 капель (3.6 мл)

Можно добавлять в бутылочку для кормления.

Легко смешивается с другими жидкостями, например, с молоком. Можно давать маленькой ложкой перед кормлением, в том числе перед кормлением грудью. Применение у недоношенных детей не рекомендуется.

Дети (> 12 месяцев до ≤ 6 лет):

- Разовая доза – 15 капель (0.6 мл)
- Максимальная суточная доза – 23 x 15 капель (14 мл)

Дети (> 6 лет до < 18 лет):

- Разовая доза – от 20 до 30 капель (от 0.8 до 1.2 мл)
- Максимальная суточная доза – не применимо

Взрослые:

- Разовая доза – от 30 до 45 капель (от 1.2 до 1.8 мл)
- Максимальная суточная доза – не применимо

Указанную дозу следует принимать каждые 4-6 ч.

При необходимости частота приема может быть увеличена для взрослых и детей в возрасте одного года и старше. Лучше всего принимать во время или после еды и, при необходимости, перед сном. Длительность применения зависит от динамики жалоб. Если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом.

При подготовке к диагностическим исследованиям желудочно-кишечного тракта.

Рентгенография: для подготовки к рентгенографии за день до исследования вечером следует принять 3-6 чайных ложек (15-30 мл).

Ультразвуковое исследование: при подготовке к УЗИ рекомендуется принять 3 чайных ложки (15 мл) вечером за день до исследования и 3 чайных ложки (15 мл) приблизительно за 3 ч до исследования.

Эзофагогастроудоденоскопия: перед эндоскопией следует принять ½ - 1 чайную ложку (2,5 - 5 мл).

Во время исследования через эндоскоп можно ввести

дополнительно несколько миллилитров суспензии для удаления пузырьков пены, вызывающих раздражение.

При острых отравлениях моющими средствами, содержащими тензиды. Доза зависит от тяжести интоксикации. Рекомендуемая минимальная доза составляет 1 чайную ложку (5 мл).

Нежелательные реакции:

До настоящего времени не наблюдалось каких-либо нежелательных реакций, связанных с применением препарата.

Передозировка:

До настоящего времени не известно о каких-либо случаях интоксикации после применения симетикона.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено.

Примечание:

Может применяться у пациентов с сахарных диабетом, поскольку не содержит углеводы.

Форма выпуска:

По 30 мл во флаконы из янтарного стекла с капельным устройством (25 капель в 1 мл).

Условия хранения:

При температуре ниже 25°C. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности: 3 года. Срок годности после вскрытия: 6 месяцев.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Перед применением препарата следует тщательно ознакомиться с инструкцией: ЛП-№ (000616)-(ПГ-RU)



ООО «Пфайзер Инновации», РФ, 123112 Москва,
Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Телефон: + 7 (495) 287-5000, факс: +7 (495) 287-5300/287-5067



Служба медицинской информации Medinfo.Russia@Pfizer.com.
Доступ к информации о рецептурных препаратах Pfizer на
интернет-сайте www.pfizermedinfo.ru

PP-SAB-RUS-0235, 19.09.2024

Список литературы

- 1 Саб®Симплекс (Симетикон) Регистрационное удостоверение П №014203/01-2002 от 04.07.2002
- 2 Инструкция по медицинскому применению препарата Саб® Симплекс
- 3 Ровенская Ю.В., Геворкян А.К.. Вопросы современной педиатрии. 2013,12 (1): 186-189
- 4 Кешишян Е.С., журнал «Практика педиатра», сентябрь 2014, с 30-34.
- 5 Кешишян Е.С., Бердникова Е.К. Эффективность использования препаратов симетикона (Саб Симплекс) у детей раннего возраста с явлениями кишечных колик, повышенным газообразованием, срыгиванием. В кн.: Врачебный контроль за здоровьем ребенка. М., 2010. / Keshishian E.S., Berdnikova E.K. Effektivnost' ispol'zovaniia preparatov simetikona (Sab Simpleks) u detei rannego vozrasta s iavleniiami kishechnykh kolik, povyshennym gazoobrazovaniem, srygivaniem. V kn.: Vrachebnyi kontrol' za zdorov'em rebenka. M., 2010. [in Russian]
- 6 ОФС.1.4.1.0043 «Выбор лекарственных форм для детей», Государственная Фармакопея Российской Федерации XV издания.
- 7 Keeratichananont S et al. The role of liquid simethicone in enhancing endoscopic visibility prior to esophagogastroduodenoscopy (EGD): A prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. J Med Assoc Thai 2010 Aug;93(8):892-7.
- 8 Sahu Y, Jadon AS, Jain P, Thakur PS, Khare B, Jain A, An Overview on Recent Advances in Pharmaceutical Suspensions, International Journal of Medical Sciences & Pharma Research, 2021; 7(1):1-3